

слабкий. Серед виявлених захворювань найбільш розповсюджений несправжній дубовий трутовик, халаровий некроз також виявлено характерні ознаки ураження сірчано – жовтим трутовиком, печіночницею звичайною, вертицильозним в'яненням, трутовиком звичайним та лускатим трутовиком. Про, що свідчить наявність сухоостою, дерев з дуплами, плодове тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони. При обстеженні виявлено ураження дерев (IV – VI категорії фізіологічного стану) ксилофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з всихаючими та всохлими скелетними гілками, дерева з нахилом 30⁰ і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
66	1	5,3	7ЯЗЗДЗ+КЛП	61	0,80	2	19	20	235

В результаті проведення обстеження даної ділянки, встановлено, що насадження у слабкому ступені уражені комплексом інфекційних захворювань: халаровий некроз, несправжній дубовий трутовик, лускатий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик, вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність сухоостою, плодове тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі скелетні гілки та водяні пагони, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ураження дерев (IV – VI категорії фізіологічного стану) ксилофагами. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30⁰ і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Шевченківське лісництво (20,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
5	2	7,9	8ДЗ2ЯЗ+ЯЗЛ	79	0,70	3	18	26	174
5	6	2,6	8ДЗ2ЯЗ+БП	79	0,65	3	17	28	150
5	11	6,5	7ДЗЗЯЗ	79	0,75	3	16	22	186

В результаті проведення обстеження вищевказаних ділянок, встановлено, що насадження уражені комплексом інфекційних захворювань, ступінь ураження насаджень – слабкий. Серед виявлених захворювань найбільш розповсюджений несправжній дубовий трутовик, халаровий некроз також виявлено характерні ознаки ураження сірчано – жовтим трутовиком, печіночницею звичайною, вертицильозним в'яненням, трутовиком звичайним та лускатим трутовиком. Про, що свідчить наявність сухоостою, дерев з дуплами, плодове тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони. При обстеженні виявлено ураження дерев (IV – VI категорії фізіологічного стану) ксилофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з всихаючими та всохлими скелетними гілками, дерева з нахилом 30⁰ і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками